

容器の使用方法

■塗布方法

1回の使用量(1mL)を以下1~5の方法で塗布してください。


ボズレーMX5
容器使用説明書
必ずお読みください。

この「容器使用説明書」
を必ずお読みのうえ、
正しくお使いください。

1

ボトルを立ててキャップを真上にはずします。次に回転部の「△」マークを矢印の方向に回して、「▲はかる」マークに合わせます。


注意：キャップを回したり、斜めにはずすと、故障の原因になります。
「▲はかる」マークをこえて無理に回すと故障の原因になります。



2

ボトルが真下を向くよう逆さにします(2~3秒程度)。逆さにすると薬液1mLがたまります。

注意：逆にした後ボトルを振らないでください。
薬液がたれる可能性があります。




裏面の続きをご覧ください。

容器の使用方法


薬液がたまった後、ボトルを真下に向けたまま回転部の「△」マークを矢印の方向に回して、「▲ぬる」マークに合わせます。「▲ぬる」マークに合わせることで、1回の使用量(1mL)が計量されます。

3 注意：回転部の「△」マークが「▲ぬる」マークにしっかり合っていないと、1mLを正しく計量できません。また、塗布する際、一度に多量の薬液が出たり、ボトル本体から1mLを超えて薬液が出続けてしまう場合があります。



逆さのまま回転部の先端を頭皮に垂直に軽く押し当てると、薬液が出てきます。薬液が完全に出なくなるまで、髪の毛の薄い部分にトントンと1~2cm間隔で塗布してください。

4 注意：回転部の「△」マークが「▲はかる」マークに合っているときは、回転部の先端が押しこめない仕様となっており、無理に塗布すると頭皮をきずつける可能性があります。



使用後は、回転部の「△」マークを「▲ぬる」マークに合わせたまま、キャップを閉めて保管してください。

5 注意：保管時、回転部の先端に白い結晶が付着することがありますが、製品の品質に問題はありません。結晶があらわれた場合は、ふきとってからお使いください。保管状態により、薬液が変色(微黄色)することがありますが、製品の品質に問題はありません。

(誤飲防止のため、回転部とボトルは外れにくくなっております)
※イラストはイメージです
2500-AD-80-00